

Nombre científico: *Xanthopsar flavus***Orden:** Passeriformes**Familia:** Icteridae**Estatus:** En peligro

Breve descripción: Miden unos 19 cm., los machos poseen la cabeza y el pecho de color amarillo muy vivo y el resto del cuerpo negro. Las hembras son menos atractivas; tienen la cabeza y el dorso pardos y el pecho y la rabadilla amarillos pero no tan llamativos. Los pichones son como estas últimas. También es conocido por Varillero Amarillo (Buenos Aires y Entre Ríos) o Dragón (en Uruguay).

Distribución: Sudamérica. Hacia el 1900, desde el S. de Paraguay y de Brasil (Estados de Río Grande do Sul y Santa Catarina), Uruguay y E. de Argentina (Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires). En la actualidad, posiblemente sólo en Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, S. de Uruguay y de Brasil.

Población: Una estima-


ción optimista, calcula su número de individuos en unos mil, distribuidos en más de 600.000 km² de Brasil, Uruguay y Argentina, con difícil intercambio genético. Se estima que nunca fue abundante - por lo menos desde 1880- y su número tal vez no haya superado los 15 a 20.000 individuos. Sin embargo, naturalistas del siglo pasado, como Darwin (en 1832) describen bandadas comunes en Maldonado (Uruguay). En 1989, el Prof. Raúl Vaz Ferreira (com. pers.) observó una bandada extraordinaria de unos 70, acompañados por Pechos Amarillos Comunes (*Pseudoleistes virescens*) y Tordos (*Molothrus spp.*), en los Baños del Este, a pocos kilómetros de Lascano (Uruguay). Los especialistas coinciden que su declinación es alarmante. Ya hay escasísimos

registros y por lo común, no se observan bandadas superiores a los 50 ejemplares. En Argentina, se la avistó en Corrientes (de donde provienen los últimos registros), en grupitos de 3 a 8 individuos, en noviembre de 1986 (3), '87 (5) y '89 (8), en el Refugio de Vida Silvestre "San Juan Poriahú" (cercano a Loreto) y en Entre Ríos, cerca de Caseros (Dpto. Uruguay) en diciembre de 1983, una bandada de 40 adultos y jóvenes, y en los alrededores de Gualaguaychú, donde existe una pequeña población, actualmente bajo estudio.

Hábitat y ecología: Habita en ecotonos de suelos anegados, entre terrenos altos y bañados o bordes de estero.

Comúnmente nidificaba en hondonadas más

o menos pantanosas, en serranías de Río Grande do Sul, con suelo saturado de agua. En Argentina, tal vez la Sierra de la Ventana era su ambiente nidificatorio (donde hoy está extinguida). Hay registros de nidos coloniales (de hasta 40 individuos), muy cerca del suelo, en cardos exóticos, matas de pastos y pequeños arbustos autóctonos. Al parecer, ponen unos cinco huevos ovales, blancos con manchas rojizas claras. Es un pájaro gregario, y por lo general siempre se halla asociado a bandadas o individuos de Monjita



TORDO AMARILLO

FICHA N°

29

Dominica (*Xolmis dominicana*), Loica Pampeana (*Sturnella defilippi*), Pecho amarillo Común, Pecho Amarillo Grande (*Pseudoleistes guirahuro*) y Varillero Negro (*Agelaius cyanopus*). Podría presumirse que la especie realiza migraciones estacionales, dado que no se la ha observado residiendo en las localidades donde se la ha avistado con mayor frecuencia, ya que las observaciones suelen efectuarse en primavera y verano en nuestro litoral.

Problemas de conservación: El drenaje de campos anegadizos pudo haber causado una disminución de su hábitat, aunque esos ambientes hoy son extensos. Al parecer, sus nidos eran bastante parasitados por los Tordos Renegridos (*Molothrus bonariensis*), pero esto, por sí solo no debería haber impactado sobre sus poblaciones. Los ictéridos de bañados suelen ser de hábitos alimenticios especializados y podría suponerse que la desa-

parición de las grandes bandadas de langostas y orugas (de las que se alimentaban sus pichones) los hayan afectado. Paralelamente, la especie sufre tráfico ilegal, para abastecer a coleccionistas, e incluso figura en catálogos de venta clandestinos. Comercialmente es conocida como "Federal Amarillo" o "Damita". En 1992, se observaron 20 a la venta ilegal en las Ferias de Pájaros de Pompeya, Villa Domínico y en el Mercado de Frutos de Tigre (Prov. de Buenos Aires), con valores que oscilaban de U\$S 40 a 60 c/u.

Medidas de conservación tomadas: Se lo ha protegido legalmente en toda su área de distribución, pero con escaso valor práctico. Fue incluido en el Apéndice III de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Fauna y la Flora Silvestres (CITES), por iniciativa de Uruguay, solicitando cooperación internacional para controlar su co-

mercio. Miembros de la Asociación Ornitológica del Plata están realizando estudios sobre la especie en Entre Ríos.

Medidas de conservación propuestas: Urgen estudios para localizar sus poblaciones y protegerlas. Un rastreo de los cambios ambientales ocurridos especialmente en el S.O. de la Provincia de Buenos Aires podría aportar datos de valor. Mayor información sobre su biología y ecología son decisivos. En caso de decomisos, los ejemplares deberían rehabilitarse, para ser liberados y repoblar áreas protegidas, o, en su defecto, formar planteles de cría, cosa que hasta el presente no ocurre.

Cría en cautividad: Se desconoce. En 1989 hubo un grupo de 13 ejemplares en el Zoológico de La Plata, originado en un decomiso, pero murieron en un lapso muy breve de tiempo. Desafortunadamente, suele ignorarse la crítica situación de la especie y la urgencia de su cría.

BIBLIOGRAFIA

- BARROWS, W.B.. 1983. Birds of the lower Uruguay. Bull. Nuttall Orn. Club 8: 83-212.
- FRAGA, R.M.. 1990. El Tordo Amarillo, al borde de la extinción. Nuestras Aves 8 (23): 13-15, AOP, Bs. As.
- DARWIN, C.. 1860. The voyage of the Beagle. Re-edición de J.M. Dent, Londres, 1959.
- GIBSON, E.. 1918. Further ornithological notes from the neighbourhood of Cape San Antonio, Province of Buenos Aires. Ibis 10: 363-415.
- HUDSON, G.E.. 1920. Birds of La Plata. J.M. Dent, Londres.
- KLIMAITIS, J.F.. 1984. Hallazgo del tordo de cabeza amarilla en la provincia de Entre Ríos. Nuestras Aves 4: 7-8. AOP, Bs. As.
- PEREYRA, J.A.. 1938. Aves de la zona ribereña del nordeste de la provincia de Buenos Aires. Mem. Jardín Zool. La Plata 9: 1-304.
- WETMORE, A.. 1926. Observations on the birds of Argentina, Paraguay, Uruguay and Chile. US Nat. Mus. Bull. 133: 1-448.
- WHITE, E.W.. 1882. Notes on birds collected in the Argentine Republic. Proc. Zool. Soc.